

Triangle équilatéral

Constructions du triangle équilatéral réalisées avec GéoPlan : Euclide, pliages, avec contraintes.

Sommaire

1. Les éléments d'Euclide
2. Construction d'un triangle équilatéral de hauteur donnée
3. Construction par pliage à partir d'un cercle
4. Cercles et triangle équilatéral
5. Triangle équilatéral inscrit dans un carré - Problème de Abu l-Wafa
6. Construire un triangle équilatéral dont deux des sommets sont situés sur deux droites
Construire un triangle équilatéral dont les sommets sont situés sur des cercles concentriques
7. Relation métrique
8. D'un triangle équilatéral à l'autre
9. Triangle et cercle inscrits
10. Triangle équilatéral inscrit dans un triangle
11. Triangle équilatéral circonscrit à un triangle

Faire des maths ... avec GéoPlan : <http://debart.pagesperso-orange.fr/index.html>

Ce document PDF : http://www.debart.fr/pdf/triangle_equilateral.pdf

Page HTML : http://debart.pagesperso-orange.fr/geoplan/triangle_equilateral_classique.html

Document n° 62, réalisé le 26/1/2004, modifié le 29/7/2009

Triangle équilatéral

Un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés sont de même longueur,

les angles sont égaux et mesurent 60 degrés (soit $\frac{\pi}{3}$ radians).

Dans un triangle équilatéral, toutes les droites remarquables (médiane, hauteur, bissectrice, médiatrice) relatives à un même côté sont confondues.

Elles ont même longueur égale à $a \frac{\sqrt{3}}{2}$, où a est la longueur du côté du triangle.


L'aire du triangle est égale à $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$.

Le centre de gravité est confondu avec l'orthocentre et les centres des cercles inscrit et circonscrit.

Le rayon $R = OA$ du cercle circonscrit est égal aux $\frac{2}{3}$ de la longueur de la médiane soit $a \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Le rayon $r = OH$ du cercle inscrit est égal au $\frac{1}{3}$ de la longueur de la médiane soit $a \frac{\sqrt{3}}{6}$.

Dans un triangle équilatéral, le cercle circonscrit a un rayon double de celui du cercle inscrit.




1. Les éléments d'Euclide

Collège : classes de sixième et cinquième

Proposition 1 du 1^{er} livre des éléments d'Euclide :

Construire un triangle équilatéral sur une ligne droite donnée et finie.



EXPOSITION. Soit AB une droite donnée et finie (on dirait maintenant un segment [AB]).

DETERMINATION. Il faut construire sur la droite finie AB un triangle équilatéral.

CONSTRUCTION. Du centre A et de l'intervalle AB, décrivons la circonférence ACD (demande 3); et de plus, du centre B et de l'intervalle BA, décrivons la circonférence BCE; et du point C, où les circonférences se coupent mutuellement, conduisons aux points A, B les droites CA, CB (demande 1).

DEMONSTRATION. Car, puisque le point A est le centre du cercle ACD, la droite AC est égale à la droite AB (définition 15); de plus, puisque le point B est le centre du cercle BCE, la droite BC est égale à la droite BA; mais on a démontré que la droite CA était égale à la droite AB; donc chacune des droites CA, CB est égale à la droite AB; or, les grandeurs qui sont égales à une même grandeur, sont égales entre elles (notion 1); donc la droite CA est égale à la droite CB; donc les trois droites CA, AB, BC sont égales entre elles.

CONCLUSION. Donc le triangle ABC (définition 24) est équilatéral, et il est construit sur la droite donnée et finie AB. Ce qu'il fallait faire.

Rappels

Demande 3. D'un point quelconque, et avec un intervalle quelconque, décrire une circonférence de cercle.

Définition 15. Un cercle est une figure plane, comprise par une seule ligne qu'on nomme circonférence ; toutes les droites, menées à la circonférence d'un des points placés dans cette figure, étant égales entre elles.


Définition 24. Parmi les figures trilatères, le triangle équilatéral est celle qui a ses trois côtés égaux.

Avec Cabri

Placer A et B et dessiner le segment [AB],
tracer les cercles de centre A et B et de rayon AB,
construire les points C et C₁ points d'intersection des cercles.
Gommer les cercles et le deuxième point d'intersection,
tracer les segments [BC] et [AC].


2. Construction d'un triangle équilatéral de hauteur donnée

a. Construction par pliage d'une feuille rectangulaire



Marquer la feuille selon la médiatrice A_1D_1 . Plier l'angle en A et rabattre A' en H sur la médiatrice A_1D_1 . Le pli de la feuille est le côté $[AC]$. Plier suivant (CH) et on obtient le côté $[BC]$. H est le milieu de $[BC]$ et l'angle AHC égal à l'angle AAC' est droit. AH est à la fois hauteur et médiane de ABC qui est isocèle en A. La hauteur AK est égale à la hauteur de la feuille AA' qui est égale à AH . Donc $AB = BC$, ABC est un triangle équilatéral. En C l'angle plat est partagé en 3 angles de 60° .


b. Construction avec une bande de papier et son axe médian



La construction du triangle équilatéral de hauteur h se fait en plaçant un des sommets au coin d'un rectangle de largeur h . Le pied H de la hauteur $[BH]$ est situé sur la médiatrice (A_1B_1) du rectangle. Ce point est aussi situé à une distance h de A.

Avec GéoPlan construire le point H intersection de $[A_1B_1]$ et du cercle de centre A passant par B. La médiatrice de $[AH]$ coupe (AA') en C et la droite (CH) coupe (BB') en D qui est le troisième sommet du triangle équilatéral BCD .

3. Construction par pliage à partir d'un cercle



Dessiner un cercle et tracer deux diamètres perpendiculaires $[AA']$ et $[DE]$. Rabattre le point A' sur O . Le pli rencontre $[AA']$ en H le cercle en B et C . Quelle est la nature du triangle ABC ?

Solution

Les triangles OBA' et OCA' , ayant leurs trois côtés de longueur égale au rayon du cercle, sont équilatéraux ; l'angle au centre BOC mesure 120° . L'angle inscrit BAC mesure 60° . ABC est un triangle équilatéral.

Longueur du côté et aire

Si R est le rayon du cercle circonscrit,


la hauteur h du triangle est $AH = AO + OH = \frac{3}{2}R$.

Avec le calcul de la hauteur $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, en simplifiant $\frac{3}{2}R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, on trouve que a , longueur du côté BC , est égal à $R\sqrt{3}$.

L'aire du triangle est $\frac{1}{2}AH \times BC = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2$.

4. Cercles et triangle équilatéral

$O_1O_2 : 4$ $AB : 6.93$ $BC : 6.93$ $AC : 6.93$



Les cercles (c_1) de centre O_1 et (c_2) de centre O_2 ont même rayon R ; le centre de l'un appartient à l'autre. Le point C est le symétrique de O_1 par rapport à O_2 . Les deux cercles se coupent en A et B .

- Montrer que le triangle ABC est équilatéral de côté $R\sqrt{3}$.

Indications : les triangles AO_1O_2 et BO_1O_2 sont équilatéraux (configuration de la figure 1). L'angle au centre AO_2B est égal à 120° . L'angle inscrit ACB

mesure 60° .

Le triangle ABC ayant la droite (CO_1) comme axe de symétrie est isocèle.

Un triangle isocèle ayant un angle de 60° est équilatéral.

Voir le paragraphe précédant pour le calcul $R\sqrt{3}$ de la longueur du côté.

Quels sont le périmètre et l'aire de la surface hachurée formée par les deux segments circulaires de part et d'autre de la corde [AB] ?

Indications : La surface hachurée est limitée par les deux arcs de cercle AO_1B et AO_2B , arcs de longueur égale. Sur le cercle (c_2) , l'arc AO_1B intercepte l'angle au centre AO_2B de 120° , égal au $\frac{1}{3}$ de 360° . La longueur de l'arc est donc est égal à $\frac{1}{3}$ du périmètre $2\pi R$ du cercle, soit $\frac{2}{3}\pi R$.

Le périmètre de la surface hachurée est alors de $\frac{4}{3}\pi R$.

La surface hachurée est la réunion de deux lunules, de même aire, délimitées par la corde [AB] et les deux arcs de cercle.

L'aire de la lunule AO_1B est égale à l'aire du secteur angulaire AO_2B diminué de l'aire du triangle AO_2B .

L'aire du secteur angulaire AO_2B est égal à $\frac{1}{3}$ de l'aire πR^2 du cercle, soit $\frac{1}{3}\pi R^2$.

Le point O_2 est le centre du triangle équilatéral ABC , de côté $R\sqrt{3}$ et d'aire $3\frac{\sqrt{3}}{4}R^2$ (voir paragraphe précédent).

AO_2B , BO_2C et CO_2A partagent en trois triangles d'aire égale le triangle ABC . L'aire du triangle

AO_2B est donc $\frac{1}{3} \times 3\frac{\sqrt{3}}{4}R^2$ soit $\frac{\sqrt{3}}{4}R^2$.

L'aire de la surface hachurée est donc de $\frac{1}{3}\pi R^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}R^2 = (\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4})R^2$.


5. Triangle équilatéral inscrit dans un carré - Problème de Abu I-Wafa

Abu'l-Wafa (Abul Wafa) est un mathématicien et astronome persan connu pour ses apports en trigonométrie et pour ses constructions à la règle et au compas.

Il est né en 940 à Buzjan dans la région de Khorasan. A l'âge de vingt ans, il part pour Bagdad où il restera jusqu'à sa mort en 998.

a. Le triangle d'Abu I-Wafa

Étant donné un carré OPCQ, construire un triangle équilatéral CIJ, I et J étant situés sur les côtés du carré.




Abu I-Wafa se posait le problème comme suit : soit OPCQ un carré de centre O_2 , et un point quelconque I sur l'arête [OP] et le point J symétrique de I par rapport à la droite (OC) ; J est alors sur [OQ]. Le triangle CIJ peut-il être équilatéral ?

La construction n'est pas unique, il s'agit d'en réaliser au moins une aboutissant à un triangle équilatéral inscrit dans le carré.

b. Solution proposée par Abu I-Wafa :

1. Construire le cercle (c_2) de centre O_2 , circonscrit à OPCQ.
2. Construire un second cercle (c_1) de centre O passant par O_2 .
3. Nommer A et B les deux points d'intersection de ces cercles.
(le triangle ABC est équilatéral comme le montre la figure du paragraphe 4)
4. On peut alors prouver que les droites (CA) et (CB) coupent les arêtes du carré en deux points qui sont les points I et J recherchés. Le triangle CIJ est équilatéral.

c. Trois triangles équilatéraux



Construction

Construire les cercles (c_1) de centre O passant C et (c_2) de centre C passant par O .

Ces deux cercles se coupent en D et H .

Soit A et B les milieux de $[OD]$ et $[OH]$.

Les droites (CA) et (CB) coupent les arêtes du carré aux points I et J .

Le triangle CIJ est équilatéral.

Indications

Les rayons $[OD]$ et $[OH]$ font un angle $D\hat{O}H$ de 120° . Leurs médiatrices (CA) et (CB) font un angle $A\hat{O}B$ de 60° .

En effet si F est le symétrique de C par rapport à O , le triangle DFH est équilatéral comme le montre la figure du [paragraphe 4](#). O est le centre du cercle circonscrit, donc (OD) et (OH) sont deux médiatrices du triangle.

(CA) et (CB) recoupent le cercle (c_1) en E et G .

Le triangle CEG symétrique (par rapport à O) de DFG est aussi équilatéral. (On note que $CDEFGH$ est un hexagone régulier).


Par symétrie par rapport à O , les cordes $[CE]$ et $[CG]$ sont les médiatrices des rayons $[OD]$ et $[OH]$ qu'elles coupent en leurs milieux A et B .

Enfin, on montre que la figure admettant (CF) comme axe de symétrie, le triangle CIJ est isocèle ; donc avec un angle ICJ de 60° , il est équilatéral.

Commandes GéoPlan


Déplacer les points O ou O_2 ,

Taper S pour la solution.



d. Rotation de centre C et d'angle 60°

Par Karim Kateb



Construire l'image (d) de la droite (OP) par la rotation r de centre C et d'angle 60° , cette droite image (d) coupe (OQ) en B, puis on obtient le point A en construisant l'image de B par la rotation réciproque r^{-1} de centre C et d'angle -60° .

Le triangle ABC est équilatéral.

Démonstration

La droite image (d) coupe bien (OQ) car sinon (d) serait parallèle à (OQ), et donc perpendiculaire à (OP) : impossible, car l'angle entre (d) et (OP) vaut 60° (ou 120°). Enfin, ABC est bien équilatéral, car A est l'image de B par la rotation réciproque r^{-1} de centre C et d'angle -60° ; B est sur (d) donc A est bien sur l'image réciproque (OP). Le triangle ABC est donc isocèle en C et d'angle au sommet 60° , les trois angles du triangle valent chacun 60°

6. Triangle équilatéral avec contraintes

a. Construire un triangle équilatéral dont deux sommets sont situés sur une droite

Étant donné un point A et une droite (d), construire un triangle équilatéral ABC, tel que les sommets B et C soient situés sur la droite (d).

Indication

À partir d'un point N de la droite (d) construire, à la règle et au compas, un triangle équilatéral MNP qui permettra, par agrandissement-réduction de trouver le triangle ABC. Pour cela on peut :

Placer un point N sur la droite (d).
Le cercle de centre A passant par N recoupe la droite (d) en P.
Les cercles de centre N passant par P et de centre P passant par N se coupent en M.
MNP est un triangle équilatéral.
Les points A et M étant équidistants de N et P, la droite (AM), médiatrice de [NP], est hauteur du triangle MNP

et du triangle ABC cherché.


Les parallèles à (MN) et (MP) passant par A coupent (d) en B et C.
Le triangle équilatéral ABC est la solution.

Remarque

Avec GéoPlan on peut déplacer le point N sur la droite (d) jusqu'à ce que M coïncide avec A.

b. Construire un triangle équilatéral dont deux sommets sont situés sur deux droites

On donne un point A et deux droites (d_1) et (d_2) .




Existe-t-il un point B sur (d_1) et un point C sur (d_2) tel que le triangle ABC soit équilatéral.

Solution


Si le triangle équilatéral ABC existe, le point C est obtenu à partir du point B par une rotation de 60° (ou de -60°) autour de A. Cela nous donne une méthode de construction de deux triangles qui en général répondent à la question :

- Premier triangle : on fait pivoter la droite (d_1) de 60° autour de A. La transformée (d_1') coupe (d_2) en C. Le point de (d_1) dont C est l'image est le point B.
- Deuxième triangle : on fait pivoter la droite (d_1) de -60° autour de A. La transformée (d_1') coupe (d_2) en C. Le point de (d_1) dont C est l'image est le point B.

Dans le cas où (d_1) et (d_2) font entre elles un angle de 60° , l'une des deux constructions reste valable. Quant à l'autre, elle en génère une infinité ou au contraire ne produit aucun triangle selon que A est sur des bissectrices de (d_1, d_2) ou pas.



Construction



Soit H la projection de A sur la droite (d_1) , on construit le cercle (c) de centre A , tangent à (d_1) en H . La médiatrice de $[AH]$ coupe le cercle (c) en U et V . Les tangentes en U et V sont les images de (d_1) par les rotations d'angles 60° et -60° . Ces deux tangentes coupent en général (d_2) en deux points C et C' . On construit les antécédents B et B' de C et C' dans les deux rotations.

Cliquer dans les figures et taper T pour afficher le triangle $AB'C'$, deuxième solution


Voir : Carrega J.-C. - Théorie des corps : la règle et le compas - Hermann 2001

Sortais Yvonne et René - Géométrie - Hermann 1988

c. Construire un triangle équilatéral dont deux sommets sont situés sur deux droites parallèles

Étant donné un point A et deux droites parallèles (d_2) et (d_3) , construire un triangle équilatéral de sommet A tel que les deux autres sommets soient situés sur chacune des droites.

Méthode 1 - rotation



Construire l'image (d_3') de la droite (d_3) par la rotation r de centre A et d'angle 60° , cette droite image (d_3') coupe (d_2) en B .

Enfin on obtient le point C en construisant l'image de B par la rotation réciproque r^{-1} de centre A et d'angle -60° (constructions faciles avec le compas et la règle).

Démonstration


(d_3') coupe bien (d_2) : en effet l'angle entre (d_3) et (d_3') étant de 60° (ou 120°), et (d_2) et (d_3) étant parallèles, l'angle entre (d_2) et (d_3') est donc de 60° (ou 120°).

Le point C appartient bien à (d_3) car C est l'image de B par r^{-1} ; B appartient à (d_3') et l'image de (d_3') par r^{-1} est (d_3) .

Enfin, ABC est bien équilatéral, car C est l'image de B par la rotation réciproque r^{-1} de centre A et d'angle -60° , donc ABC est isocèle en A et d'angle au sommet 60° , ces trois angles valent donc chacun 60° .

Où l'on construit un triangle équilatéral - Où l'on calcule l'aire de ce triangle équilatéral : exercice bac S centres étrangers 1998

Méthode 2 - cercle circonscrit



Construire un triangle équilatéral dont les sommets sont situés sur trois droites parallèles (d_1) , (d_2) et (d_3) .

On peut choisir arbitrairement un point A sur la droite (d_1) - *figure plus simple en choisissant la droite du centre.*

Démonstration : À partir du point A tracer les droites (d_2') et (d_3') faisant avec la droite (d_1) des angles de 60° (avec GéoPlan utiliser les images d'un point de (d_1) par les rotations

de centre A et d'angles 60° et -60°).

(d_2') coupe (d_2) en B_2 et (d_3') coupe (d_3) en C_3 . Le cercle circonscrit au triangle AB_2C_3 recoupe (d_2) en B et (d_3) en C. Les angles inscrits AB_2B et AC_3C , égaux à 120° , interceptent sur le cercle deux arcs dont les longueurs sont égales au tiers de la circonférence. Les angles inscrits supplémentaires ACB et ABC sont égaux à 60° et le triangle ABC est une solution du problème.


Problèmes analogues

Construire un triangle rectangle isocèle dont :

- les deux sommets des angles aigus sont situés sur deux droites,
- le sommet de l'angle droit est situé sur une droite, un des sommets d'un angle aigu est situé sur une autre droite.

d. Construire un triangle équilatéral dont les sommets sont situés sur des cercles concentriques

Construire un triangle équilatéral ABC connaissant les distances a, b, c de ses sommets A, B, C à un point O donné. On peut choisir arbitrairement un point A tel que $OA = a$.



Construire l'image (c') du cercle (c_1) par la rotation r de centre A et d'angle 60° .

Si l'on peut construire un triangle dont les côtés mesurent a, b, c ; ce cercle image (c') coupe le cercle (c_2) aux points C et C' .


Enfin, on obtient les points B et B' en construisant les images de C et C' par la rotation réciproque r^{-1} de centre A et d'angle -60° .

On obtient ainsi deux triangles équilatéraux ABC et $A'B'C'$.

Par symétrie autour de la droite (AO) on trouve deux autres solutions, soit quatre solutions pour un sommet donné.

Cas particulier

Si le triangle dont les côtés mesurent a, b, c est aplati (ici $a = b + c$) ; ce cercle image (c') est tangent au cercle (c_2) en C.




Les quatre points O, A, B, C sont cocycliques.

On en déduit que, si O est un point du cercle circonscrit à un triangle équilatéral ABC, l'une des longueurs OA, OB, OC est la somme des deux autres.

7. Relation métrique

MA : 4.6 MB : 1.9 MC : 2.7

Classe de seconde



ABC est triangle équilatéral.

M un point du cercle circonscrit (c) , M est entre B et C.

Montrer que $MA = MB + MC$.

Indication

Soit I le point de $[AM]$ équidistant de M et C.

MIC triangle isocèle ayant un angle de 60° (angle inscrit AMC dans le cercle (c) égal l'angle ABC), est aussi équilatéral.

La rotation de centre C et d'angle 60° transforme I en M et A en B.


Donc $IA = MB$ et $MB + MC = IA + IM = MA$.

Bissectrice

Une étude des angles inscrits permet de remarquer que BMC complémentaire de BAC mesure 120° , que $AMB = ACB = 60^\circ$ et $AMC = ABC = 60^\circ$, (MA) est la bissectrice de BMC.

8. D'un triangle équilatéral à l'autre

Classe de seconde



ABC est un triangle équilatéral inscrit dans un cercle (c).

F est le point de [BC] tel que $FB = k FC$.
On choisira $k = 1, 2$ ou 3

La droite (AF) recoupe le cercle en D.

La droite parallèle à (AD) passant par B coupe (CD) en E.

a. Montrer que BED, ayant deux angles de 60° , est un triangle équilatéral.

Vérifier que $\frac{1}{DF} = \frac{1}{DB} + \frac{1}{DC}$ et calculer DF.

b. Calculer le rapport de l'aire du triangle ABC sur l'aire du triangle BED.

Indication

a. Les angles inscrits ADC et ADB sont égaux à 60° .

(DF) est une bissectrice du triangle BCD et $DB/DC = FB/FC = k$, soit $DB = k DC$.

Le triangle BED, ayant deux angles de 60° , est un triangle équilatéral ;
on note a son côté : $DB = DE = a$ et $DC = a/k$.

Par hypothèse (FD) // (BE), d'après la propriété de Thalès dans le triangle BCE on a : $\frac{CE}{DC} = \frac{BE}{FD}$.

$$\frac{1}{DB} + \frac{1}{DC} = \frac{1}{DC} + \frac{1}{DE} = \frac{DE + DC}{DC \times DE} = \frac{CE}{DC \times DE} = \frac{CE}{DC} \times \frac{1}{DE} = \frac{BE}{FD} \times \frac{1}{DE} = \frac{1}{DF}.$$

$$\text{On a bien } \frac{1}{DF} = \frac{1}{DB} + \frac{1}{DC}$$

De $DB = k DC = a$ on trouve $\frac{1}{DF} = \frac{1}{DB} + \frac{k}{DB} = \frac{k+1}{DB}$, d'où $DF = \frac{DB}{k+1}$; soit $DF = a/(k+1)$.

b. Soit I le milieu de [DE]. La hauteur de BED est $IB = a \frac{\sqrt{3}}{2}$.


$CI = CD + DI = \frac{a}{k} + \frac{a}{2} = a \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{2} \right)$. Avec la relation de Pythagore dans le triangle rectangle BCI :

$$CB^2 = CI^2 + IB^2 = a^2 \left[\left(\frac{1}{k} + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right] = a^2 \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k} + 1 \right),$$

le rapport de l'aire du triangle ABC sur l'aire du triangle BED est égal au rapport des carrés de leurs côtés, donc $\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k} + 1$.

Pour $k = 2$ on a un rapport de $\frac{7}{4}$.

9. Triangle et cercle inscrits



Un triangle équilatéral est inscrit dans un cercle, lui-même inscrit dans un autre triangle équilatéral.

La longueur du côté du petit triangle étant 1, quelle est celle du côté du grand ?

Solution

Tracer le triangle médian $A_1B_1C_1$ de $A'B'C'$. Ce triangle équilatéral inscrit dans le cercle a ses côtés de longueur 1.

Le triangle $A'B'C'$ est alors décomposé en quatre triangles équilatéraux de même taille que ABC. Le côté $A'B' = A'C_1 + C_1B' = 1 + 1 = 2$ du grand triangle est double de celui du petit.

Remarque


Le cercle circonscrit au triangle $A'B'C'$ a un rayon R double du rayon r du cercle circonscrit au triangle ABC. Ce cercle est le cercle inscrit dans le triangle $A'B'C'$.

D'où : dans un triangle équilatéral le cercle circonscrit a un rayon double de celui du cercle inscrit.

Inscrire, circonscrire un triangle équilatéral à un triangle donné

Classe de première L

10. Triangle équilatéral inscrit dans un triangle donné



Construction s'appuyant sur des rotations.

Choisir un point P sur le côté [AB].


La rotation de centre P et d'angle 60° transforme la droite (BC) en $(B'C')$.

Le point d'intersection R de [AC] et $(B'C')$, s'il existe, est un point du triangle équilatéral cherché.

On trouve le troisième point Q, image de R par la rotation réciproque d'angle -60° .

Le triangle équilatéral PQR est inscrit dans le triangle ABC.

11. Triangle équilatéral circonscrit à un triangle donné



Construction s'appuyant sur des arcs capables.

Il s'agit de trouver des points Q et R tels que de ces points « on voit » les côtés [BC] et [AC] sous un angle de 60° .

Pour cela, construire les triangles équilatéraux BCQ' et ACR' . Les arcs capables sont situés sur les cercles circonscrits à ces triangles.

Choisir un point Q sur l'arc BC. La droite (QC) coupe l'arc AC en R.

Terminer le triangle équilatéral avec le sommet P intersection des droites (QA) et (RA).